Reptiles et Batraciens recueillis en Indo-Chine par la Mission de MM. Delacour et Lowe,

par M. F. Angel.

Les matériaux herpétologiques rassemblés par la Mission Delacour et Lowe, en 1926 et 1927, ont été remis au Muséum d'Histoire naturelle et au British Museum de Londres. Une partie de la collection étudiée à Londres, l'an dernier, fut partagée avec le Muséum de Paris; le reste de la collection, dont la moitié des exemplaires a été adressée au British Museum, fait l'objet de la note présente. Dans cette série se trouve mentionnée l'espèce nouvelle de Grenouille (*Rana Delacouri* Angel) qui a fait l'objet d'une description dans un numéro précédent de ce Bulletin [1].

REPTILES.

Geckonidés.

Gecko verticillatus Laur. 7 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Hemidactylus Karenorum Theob. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Agamidés.

Calotes Rouxii Dum. Bibr. 1 ex. Djiring, S. Annam.

La région dorsale porte, sur un fond jaunâtre clair, entre la nuque et les membres postérieurs, cinq grandes taches brunes assez régulièrement espacées. De certaines de ces taches descend une bande courte, étroite, qui se sépare en deux tronçons descendant plus ou moins régulièrement sur les côtés. La queue, les membres et les doigts montrent des bandes transversales foncées dans lesquelles, le plus souvent, le centre de chaque écaille reste clair. Une bande claire bordée de brun traverse le dessus de la tête dans le milieu de la région sus-oculaire. La gorge, qui conserve des teintes bleutées, porte des chevrons plus ou moins distincts dont la pointe est dirigée vers l'arrière. Les plus longues épines de la crête nuchale mesurent 1 fois 1/2 le diamètre du tympan.

[1] *Bull. du Mus.*, 1928, p. 319.

Calotes versicolor Daud. 1 ex. ♂. Langson, Tonkin.

Les joues sont très fortement gonflées au-dessous et en arrière du tympan. On compte 42 écailles autour du milieu du corps. Le membre postérieur, étendu en avant, atteint le bord postérieur de l'œil.

Calotes emma Gray. 3 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Draco maculatus Cantor. 1 ex. ♂. Djiring, S. Annam.

Physignathus cocincinus Cuv. 3 ex, Bac-Kan, Tonkin.

Le nombre des plaques gulaires agrandies, situées de chaque côté, parallèlement aux labiales inférieures est respectivement de 10-11, 11-11, 10-11.

Scincidés.

Mabuia multifasciata Kuhl. 7 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Les supranasales ne se touchent pas, en arrière de la rostrale, sur aucun des exemplaires. Le nombre des labiales supérieures précédant la sous-oculaire varie suivant les individus; on trouve les chiffres suivants : 4-4; 4-4; 4-4; 3-3; 3-3; 4-3; 3-4; 3-4.

Boidés.

Python molurus L. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Colubridés.

Zamenis Korros Schleg. 4 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Coluber radiatus Schleg. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.
Longueur : 1 m. 60.

Simotes violaceus? Cantor. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.
V = 190. An. div. S. Caud. = 50/2. Ec. = 17 r. T. 1 + 2.

Par sa possession de 17 rangs d'écailles, d'une simple temporale antérieure et des quatrième et cinquième labiales supérieures bordant l'œil, cet individu peut être rapporté à *S. violaceus*. Il en diffère, cependant, par différents caractères d'écaillure et de coloration.

Tropidonotus subminiatus Schl. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Dipsadomorphus multimaculatus Boié. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.

Bungarus fasciatus Schn. 1 ex. en peau. Langson, Tonkin.

Callophis macclellandi Reinh. 1 ex. Bac-Kan, Tonkin.

BATRACIENS.

Ranidés.

Rana Delacouri Angel. 2 ex. Bac-Kan, Tonkin.
— *limnocharis* Wiegm. 8 ex. Bac-Kan, Tonkin.
Rana (*Hylorana*) *graminea* Blgr. 1 ex. ♂. Bac-Kan, Tonkin.
— *tigrina forma typica* Blgr. 1 ex. ♀. Bac-Kan, Tonkin.
— *japonica?* Blgr. 1 ex., Bac-Kan, Tonkin.
Rana Dubois-Reymondi [1] Vogt. 1 ex. ♂. Langson, Tonkin.

[1] Exemplaire étudié et déterminé par M. Parker, du British Museum.